Tos Ferina

Serie de Educación de Paciente MU

Definición:

La tos ferina es una infección respiratoria muy grave (en los pulmones y las vías respiratorias), causada por la bacteria pertussis llamada Bordetella Pertussis. Esto causa una tos violenta que no se puede parar. La tos ferina es más dañina para los bebés pequeños y puede ser mortal. La vacuna DTaP protege contra la tos ferina.

Signos / Síntomas:

- Nariz que moquea
- Estornudos
- Tos leve
- Una pausa en la respiración en bebés (apnea)
- Después de 1 a 2 semanas a menudo comienza la tos severa

Particularidades en bebés y niños:

- Los niños y los bebés pueden toser muy fuerte, una y otra vez
- Cuando los niños jadean por falta de aire después de un ataque de tos, hacen un "silbido"
- Los bebés no pueden toser o hacer este sonido
- Los ataques de tos hacen difícil respirar, comer, beber o dormir
- Los ataques de tos ocurren más por la noche
- Bebés y niños pequeños pueden volverse azules al toser debido a la falta de oxígeno
- Bebés y niños pequeños pueden vomitar después de los ataques de tos
- Los ataques de tos pueden durar 10 semanas, esto puede irse y volver

Tratamiento para la tos ferina:

- Hay disponible una vacuna llamada DTaP

www.MEDLINEUNIVERSITY.com ©2013 Medline Industries, Inc. Medline y Medline University son marcas registradas de Medline Industries, Inc.

Beneficios de la vacuna DTaP:

- Salva vidas
- Protege a los niños contra enfermedades graves
- Mantiene a otras personas seguras

¿Cómo se propaga la tos ferina?

- Se propaga fácilmente a través del aire cuando una persona infectada respira, tose o estornuda
- Puede propagarse mientras hay presentes síntomas de un resfriado
- Se puede propagar durante al menos 2 semanas después de que comience la tos

¿Qué se puede hacer para proteger a un niño contra la tos ferina?

- Mantener los recién nacidos lejos de cualquier persona con síntomas de resfriado o tos
- Administrar a tiempo la vacuna para la tos ferina
- Asegurarse de que los miembros de la familia han sido vacunados
- Mantener un registro de vacunas

¿Qué es la vacuna DTaP?

La vacuna DTaP es una inyección que combina las vacunas para la tos ferina y otras dos enfermedades graves: difteria y tétanos. La vacuna DTaP protege mediante preparando a su cuerpo para combatir las bacterias.

¿Cuándo debe recibir una persona la vacuna DTaP?

Los niños deben recibir cinco dosis de la vacuna DTaP en las siguientes edades para mejor protección:

- Una dosis a los 2 meses
- Segunda dosis a los 4 meses
- Tercera dosis a los 6 meses
- Cuarta dosis de los 15 a los 18 meses
- Quinta dosis entre los 4 y 6 años de edad

Pre-adolescentes, adolescentes y adultos deben recibir una vacuna Tdap de refuerzo una sola vez

- Los preadolescentes deben recibir la vacuna de refuerzo a los 11 o 12 años de edad
- Los adolescentes y adultos que no recibieron la vacuna Tdap como pre-adolescentes deben recibirla

www.MEDLINEUNIVERSITY.com ©2013 Medline Industries, Inc. Medline y Medline University son marcas registradas de Medline Industries, Inc.

Recursos:

Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. 2013. Diseases and Vaccines that prevent them. Tos ferina Consultado el 8 de agosto de 2013 desde: http://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/pertussis/downloads/PL-dis-pertussis-color-office.pdf

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD:

Medline no practica la medicina, y ninguna información presentada en este sitio web es un consejo médico o pretende sustituir el consejo de un médico. Toda la información en este sitio web acerca de las condiciones médicas proviene de fuentes de acceso público.

www.MEDLINEUNIVERSITY.com ©2013 Medline Industries, Inc. Medline y Medline University son marcas registradas de Medline Industries, Inc.